

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN TECHNIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES RHONE-ALPES

AIN, ARDECHE, DROME, ISERE, LOIRE, RHONE, SAVOIE, HAUTE-SAVOIE

ARBO. VITI. RHONE-ALPES**ABONNEMENT ANNUEL: 90 f**

REGISSEUR RECETTES D.D.A. CCP LYON 9431-17A



Circonscription RHONE-ALPES

55, rue Mazenod 69426 LYON CEDEX 3

2 Février 1984

N° de série continue 271

Bulletin n° 3

ARBRES FRUITIERS**PSYLLE DU POIRIER**

L'examen de la maturité des femelles donne les situations suivantes dans les différents secteurs de la Circonscription :

- Sud de l'Ardèche, de la Drôme et moyenne Vallée du Rhône :
TRAITER : l'époque favorable a déjà été atteinte
- Région lyonnaise :
TRAITER : car ce moment arrive actuellement
- Savoies :
ATTENDRE : les femelles sont toujours immatures en ce moment

Conditions d'un bon traitement : l'effectuer le 2ème jour consécutif de beau temps (par température supérieure à 7°, et calme)

TEIGNE DES FLEURS DE CERISIER

Les traitements d'hiver aux colorants nitrés à 600 g/hl (même jusqu'à 1 kg/hl) indiqués dans le précédent Bulletin sont très efficaces contre ce parasite.

TRAITEMENTS D'HIVER

Nous sommes toujours dans la période de ces traitements et nous vous rappelons les conditions nécessaires à leur bonne réussite :

- PÉRIODE DE REPOS VÉGÉTATIF
- PULVÉRISATION À FORTE PRESSION
- BIEN MOUILLER
- AGIR PAR TEMPS SEC ET SANS VENT

Nous vous signalons que les poiriers de la région lyonnaise sont porteurs pour la plupart de nombreux oeufs d'acariens rouges et qu'ils sont justiciables de ces traitements d'hiver.

CLOQUE DU PECHER

L'intervention contre cette maladie est à faire dès que les bourgeons à bois des extrémités cessent leur repos hivernal et commencent à évoluer. Actuellement, ce moment n'est atteint que dans le Sud de l'Ardèche et de la Drôme et pour les variétés les plus précoces. Nous rappelons pour ces quelques cas que les produits à employer sont : le Zirame, le Thirame, le Ferbame et le Captafol, et qu'il est indispensable de bien mouiller les extrémités des rameaux.

Les prochains Bulletins vous tiendront au courant de la situation.

7474

DEPERISSEMENT BACTERIEN DU PECHER

Des lésions sur bourgeons ont déjà été observées, en janvier, dans les régions les plus précoces.

De ce fait, nous vous recommandons de :

- Tailler vos arbres le plus tard possible
- Terminer les opérations de taille par les variétés les plus sensibles
- Désinfecter sécateurs et outils à l'alcool à brûler après la taille de chaque arbre
- Protéger les grosses plaies par un badigeon antiseptique (SANTAR - KANKERTOX 3)
- Eliminer toutes les parties malades
- Brûler les bois de taille
- Arracher et incinérer les arbres morts